

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Canespie Clotrimazol 10 mg/ g crema. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Composición cualitativa cuantitativa:** Cada gramo de crema contiene 10 mg de clotrimazol. **Excipiente(s) con efecto conocido.** Cada gramo contiene 100 mg de alcohol cetosteárico y 20 mg de alcohol bencílico. Para consultar la lista completa de excipientes ver Ficha Técnica. **FORMA FARMACÉUTICA:** Crema de color blanco, **DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas:** Tratamiento de tinea pedis o pie de atleta .Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes antifúngicos. **Posología y forma de administración. Posología:** Se recomienda la aplicación de la crema en la zona afectada mediante fricción 2 – 3 veces al día hasta su completa absorción, durante un periodo de entre 3 y 4 semanas. Debe suspenderse el tratamiento si los síntomas no mejoran después de 10 días de tratamiento (ver (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se recomienda continuar el tratamiento durante 2 semanas tras desaparecer la desaparición de los síntomas. **Uso en pacientes de edad avanzada:** No se requiere una modificación de la dosis para este grupo de pacientes. **Uso en población pediátrica.** Su uso en niños menores de 12 años se efectuará bajo control médico. No se requiere una modificación de la dosis para este grupo de pacientes. **Forma de administración:** Uso cutáneo. Aplicar y extender una pequeña cantidad del producto hasta cubrir completamente el área afectada y la zona circundante, con especial atención entre los pliegues de los dedos de los pies. Friccionar hasta su completa absorción. Una tira de crema, de aproximadamente 2 cm, es suficiente para tratar un área del tamaño de la mano (dorso y palma). Como orientación 2 cm equivalen a la longitud de la última falange del dedo índice. Se recomienda seguir las siguientes instrucciones: - Antes de la aplicación del producto, lavar los pies con agua y jabón - Después del lavado deben secarse a fondo, sobre todo los espacios interdigitales- Cerrar bien el tubo tras su utilización. - Lavar las manos después de cada aplicación. Se deben aplicar medidas generales de higiene con el fin de evitar la aparición de otras infecciones o recidivas (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al clotrimazol, a imidazoles en general o a alguno de los excipientes. **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** No se recomienda el uso de vendajes oclusivos tras la aplicación del producto, ya que favorece la absorción sistémica del fármaco. Debe suspenderse el uso de este producto si aparece irritación en la zona tratada. Debe suspenderse el tratamiento si los síntomas no mejoran después de 10 días de tratamiento. No ingerir. Evitar el contacto del producto con ojos y mucosas. Si accidentalmente se produjese contacto con los ojos, lavar con agua abundante y consultar con un oftalmólogo si fuese necesario . El tratamiento debe ir siempre acompañado de medidas de higiene corporal y vestimenta adecuada por la posibilidad de reinfección. Se aconseja utilizar zapatos bien ventilados, evitar zapatos y suelas de goma, evitar calcetines de fibra y cambiarse los calcetines con cada aplicación. Para evitar contagios, no se deben compartir toallas, calcetines ni calzado con otras personas ni se debe andar descalzo en piscinas, vestuarios y baños colectivos. **Advertencias sobre excipientes:** Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetosteárico. Este medicamento contiene 20 mg de alcohol bencílico en cada gramo de crema. El alcohol bencílico puede provocar reacciones alérgicas. El alcohol bencílico puede provocar irritación local moderada. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** No se han descrito. **Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo:** Si bien existe una cantidad limitada de datos clínicos en mujeres embarazadas, los estudios en animales no muestran efectos dañinos directos o indirectos sobre la toxicidad reproductiva (ver sección Datos preclínicos de seguridad). Las investigaciones experimentales y la experiencia post-comercialización revelan que no cabe esperar efectos perjudiciales en la madre y el niño si se usa este preparado durante el embarazo. El clotrimazol puede utilizarse durante el embarazo, pero solo bajo la supervisión de un profesional sanitario. **Lactancia:** No hay datos sobre la excreción de clotrimazol en la leche humana. Sin embargo, la absorción sistémica es mínima tras la administración tópica y es poco probable que produzca efectos sistémicos. El clotrimazol puede utilizarse durante la lactancia. **Fertilidad:** No se han realizado estudios en humanos sobre los efectos que puede producir el uso del clotrimazol en la fertilidad, sin embargo, los estudios en animales no han demostrado ningún efecto adverso en la fertilidad de los mismos. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** La influencia de Canespie sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. **Reacciones adversas:** Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el uso posterior a la aprobación de clotrimazol. Debido a que estas reacciones son reportadas voluntariamente por una población de tamaño incierto, no puede estimarse su frecuencia a partir de los datos disponibles. Las reacciones adversas más frecuentes son: Frecuencia no conocida. *Trastornos del sistema inmunológico:* Angioedema, reacción anafiláctica, hipersensibilidad. *Trastornos vasculares:* Síncope, hipotensión. *Trastornos del sistema respiratorio, torácico y mediastínico:* Disnea. *Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:* Ampollas, dermatitis de contacto, eritema, parestesia, urticaria, exfoliación y erupción cutánea, prurito, sensación de picazón/quemazón cutánea. *Trastornos generales y en el lugar de aplicación:* Irritación del lugar de aplicación, reacción en el lugar de aplicación, edema, dolor. **Notificación de sospechas de reacciones adversas:** Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>. **Sobredosis.** No se No se preve riesgo de intoxicación aguda ya que es improbable que se produzca una sobredosis tras una sola aplicación cutánea (aplicación sobre una gran superficie en condiciones favorables para la absorción) o tras la ingestión oral inadvertida. No existe un antídoto específico. **DATOS FARMACÉUTICOS. Incompatibilidades:** No

procede. **Naturaleza y contenido del envase:** Tubo de aluminio con tapón de rosca que contiene 30 gramos de crema. Se acondiciona en una caja de cartón. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** BAYER HISPANIA, S.L., Av. Baix Llobregat, 3-5, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), España. **P.V.P. con IVA:** 11,86€ **MEDICAMENTO NO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA.** **FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO:** FEBRERO 2021. La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) [HTTP://WWW.AEMPS.GOB.ES/](http://www.aemps.gob.es/).
CMFTv1.0