

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Rennie 680 mg/80 mg comprimidos masticables con sacarina y Rennie 680 mg/80 mg comprimidos masticables con sacarosa. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Cada comprimido masticable contiene: 680 mg de carbonato de calcio y 80 mg de carbonato de magnesio. **Excipientes con efecto conocido:** Rennie sacarina: cada comprimido contiene 400 mg de sorbitol (E-420). Rennie sacarosa: cada comprimido contiene 475 mg de sacarosa. **FORMA FARMACÉUTICA:** Comprimidos masticables. Son comprimidos cuadrados de color blanco-crema con olor a menta. **DATOS CLÍNICOS:** Indicaciones terapéuticas: Alivio y tratamiento sintomático de la acidez y ardor de estómago en adultos y adolescentes mayores de 12 años. Posología y forma de administración: Posología: Adultos y adolescentes mayores de 12 años: La dosis recomendada es de 680 mg de carbonato de calcio y 80 mg de carbonato de magnesio ó 1.360 mg de carbonato de calcio y 160 mg de carbonato de magnesio (1 ó 2 comprimidos), administrados preferiblemente 1 hora después de las comidas y antes de acostarse. Adicionalmente, en caso necesario entre dosis, puede administrarse una dosis extra. No tomar más de 6 comprimidos al día, salvo mejor criterio médico. Población pediátrica: Niños menores de 12 años: No utilizar en niños menores de 12 años. Forma de administración: Vía oral. Los comprimidos deben masticarse o dejarse disolver en la boca. No se necesita agua. Debe consultar al médico si empeora o si no mejora después de 7 días de tratamiento. **CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad al carbonato de calcio o al carbonato de magnesio o a alguno de los excipientes. Insuficiencia renal severa. Hipercalcemia y/o condiciones que provoquen hipercalcemia. Hiper calciuria. Antecedentes de hipofosfatemia. Nefrolitiasis asociada a cálculos renales de calcio. **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:** Evitar el uso prolongado. No se debe exceder la dosis indicada. Si los síntomas se agravan o persisten, evaluar la situación clínica. Como ocurre con otros antiácidos, Rennie puede enmascarar los síntomas de una afección gástrica mayor por lo que si los síntomas persisten a pesar del tratamiento, se recomienda tomar medidas diagnósticas para descartar una enfermedad más grave. Debe administrarse con precaución en el caso de pacientes con alteración de la función renal. Si se utiliza Rennie en este tipo de pacientes, deberían monitorizarse regularmente los niveles plasmáticos de calcio, fosfato y magnesio. La administración de dosis altas durante largo tiempo puede producir efectos indeseables como hipercalcemia, hipermagnesemia y alcalosis metabólica (síndrome de leche-alcalino), especialmente en pacientes con insuficiencia renal. El medicamento no se debe tomar con grandes cantidades de leche o productos lácteos. El uso prolongado probablemente potencia el riesgo de desarrollar cálculos renales. Si los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento se debe evaluar la situación clínica. Población pediátrica: No administrar en menores de 12 años, salvo criterio médico. Advertencias sobre excipientes: Este medicamento contiene 400 mg de sorbitol en cada comprimido. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) no deben tomar este medicamento. **INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:** Los cambios en el grado de acidez del jugo gástrico, como los causados por la ingestión de antiácidos pueden afectar la absorción de otros medicamentos administrados simultáneamente. El uso simultáneo de calcitonina con suplementos de calcio puede antagonizar el efecto de la calcitonina en el tratamiento de la hipercalcemia. El uso simultáneo de fosfato sódico y calcio puede disminuir la eficacia del fosfato sódico de celulosa para prevenir la hiper calciuria. El uso de anticonceptivos orales (estrógenos) junto con calcio puede incrementar la absorción de calcio. Los diuréticos tiazídicos con dosis elevadas de calcio reducen la excreción urinaria de calcio. Los niveles de calcio en suero deben ser monitorizados durante el uso concomitante de diuréticos tiazídicos ya que pueden producir un aumento del riesgo de hipercalcemia. Se ha observado que los antiácidos que contienen calcio y/o magnesio pueden formar complejos con ciertas sustancias como el etidronato, productos que contienen hierro, antidisquinéticos, antimuscarínicos, fenotiazinas, benzodiazepinas, ketoconazol, diflunisal, antihistamínicos H₂, sucralfato, anticoagulantes orales derivados de la cumarina o indandiona, antibióticos como las tetraciclinas o quinolonas, por lo que pueden disminuir la absorción de estas sustancias. Esto se debe tener en cuenta cuando se administren conjuntamente. Las sales de calcio reducen la absorción de fluoruros. Las sales de calcio y/o magnesio en dosis que alcalinizan la orina puede inhibir la excreción urinaria de anfetaminas o quinidina, lo que puede dar lugar a toxicidad. Las sales de calcio y/o magnesio, por alcalinización de la orina, pueden aumentar la excreción renal de salicilatos y disminuir los niveles séricos, por lo que puede ser necesario ajustar la dosis de salicilatos. El uso simultáneo de vitamina D y calcio puede incrementar excesivamente la absorción intestinal de calcio, incrementando el riesgo de hipercalcemia en pacientes susceptibles. El uso simultáneo de vitamina D con antiácidos que contienen magnesio puede producir hipermagnesemia, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal crónica. El uso simultáneo y prolongado de leche o productos lácteos y carbonato cálcico puede dar lugar al síndrome de leche-alcalino. El uso simultáneo de sales de calcio y/o magnesio con glicósidos cardíacos (como digoxina) o medicamentos como levotiroxina y el trombopag, disminuyen la absorción de éstos últimos ya que pueden formar complejos con ellos, viéndose así reducidos sus niveles en sangre. Esto se debe tener en cuenta cuando se administren conjuntamente. Las sales de calcio y magnesio pueden impedir la absorción de fosfatos. Debido a esta interferencia en la tasa de absorción de otros medicamentos administrados de forma concomitante, se

recomienda tomar los suplementos de calcio y/o magnesio de 1 a 2 horas después de la administración de otros medicamentos. **INTERACCIONES CON PRUEBAS ANALÍTICAS:** La administración de antiácidos puede interferir con ciertos valores fisiológicos/analíticos. Las sales de calcio y magnesio pueden antagonizar el efecto de la pentagastrina y la histamina cuando se evalúa la función secretora ácida gástrica; no se recomienda administrar antiácidos en la mañana en que se van a realizar dichas pruebas. Las concentraciones séricas de calcio pueden aumentar cuando se administra este medicamento. Las concentraciones séricas de gastrina pueden aumentar con suplementos de calcio y magnesio. Las concentraciones séricas de fosfato pueden disminuir por uso prolongado y excesivo de suplementos de calcio. Las concentraciones séricas de potasio pueden disminuir por el uso prolongado y excesivo de suplementos de magnesio. El pH sistémico y urinario puede aumentar con la ingesta de antiácidos. **FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA:** Embarazo: No se han realizado estudios adecuados y controlados en animales ni en humanos; sin embargo, se ha descrito que los antiácidos causan efectos adversos tales como hipercalcemia, hipermagnesemia y aumento de los reflejos tendinosos en los fetos y/o en los neonatos cuyas madres toman de forma crónica antiácidos que contienen calcio y/o magnesio, especialmente en dosis elevadas. No se ha observado un mayor riesgo de defectos congénitos tras el uso de carbonato de calcio, carbonato de magnesio durante el embarazo. Las mujeres embarazadas deben limitar la toma de Rennie comprimidos masticables a la dosis diaria máxima recomendada. Lactancia: No se han descrito problemas durante la lactancia en humanos; aunque en la leche materna se puede excretar cierta cantidad de calcio y magnesio, la concentración no es lo suficientemente grande como para producir efectos en el neonato. Rennie puede ser utilizado durante el embarazo y la lactancia si se toma de acuerdo con las recomendaciones y se evitan ingestas prolongadas y dosis altas. Durante el embarazo y la lactancia, se debe tener en cuenta que el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio proporcionan una cantidad sustancial de calcio adicionalmente a la ingesta diaria de calcio. Por esta razón, las mujeres embarazadas deben limitar la toma de carbonato de calcio y carbonato de magnesio a un máximo de una semana y deben limitar la toma excesiva de leche (1 litro de leche contiene hasta 1,2 g de Calcio elemental) y productos lácteos para prevenir una sobrecarga de Calcio que podría resultar en el conocido “Síndrome de leche alcalino”, una enfermedad rara pero sería que requiere atención médica. **EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MAQUINARIA:** La influencia de Rennie comprimidos masticables sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. **REACCIONES ADVERSAS:** Cuando se utiliza normalmente, a las dosis recomendadas, no es de esperar la aparición de efectos adversos. Las reacciones que se mencionan a continuación están basadas en notificaciones espontáneas y su frecuencia no se ha establecido con exactitud. Trastornos del sistema inmunológico: En muy raras ocasiones se han notificado reacciones de hipersensibilidad. Los síntomas clínicos pueden incluir erupción cutánea, urticaria, angioedema y anafilaxia. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: La utilización prolongada de altas dosis puede producir una hipermagnesemia (con antiácidos que contienen magnesio) o hipercalcemia y alcalosis metabólica que pueden producir síntomas gastrointestinales, debilidad muscular, depleción de fosfatos y nefrolitiasis, especialmente en pacientes con alteración de la función renal. Trastornos gastrointestinales: Pueden aparecer náuseas, vómitos, molestias de estómago y diarrea. A pesar de que el magnesio puede producir un efecto laxante y el calcio un efecto astringente, dado el bajo contenido de magnesio y calcio en Rennie comprimidos masticables con sacarina a las dosis recomendadas, no son de esperar efectos indeseables en este sentido, aunque en algún caso se ha producido estreñimiento. Debido al CO₂ producido en el estómago puede presentarse flatulencia, eructos y distensión del estómago. Trastornos musculoesqueléticos y del sistema conjuntivo: Puede aparecer debilidad muscular. **Reacciones adversas que sólo ocurren en el contexto de Síndrome de leche alcalino:** Trastornos gastrointestinales: Ageusia. Trastornos generales y en el lugar de administración: Calcinosis y astenia. Trastornos del Sistema Nervioso: Dolor de cabeza. Trastornos renales y urinarios: Azotemia. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>. **SOBREDOSIS:** Especialmente en pacientes con alteración de la función renal, la administración prolongada de altas dosis de carbonato de calcio y carbonato de magnesio puede producir insuficiencia renal, hipermagnesemia, hipercalcemia y alcalosis, lo que puede conducir a un aumento de los síntomas gástricos (náusea, vómitos y estreñimiento), anormal fatiga muscular, micción dificultosa o dolorosa y cálculos renales. En estos casos, sería recomendable suspender la administración del producto e hidratar al paciente. En casos graves de sobredosis (ej. Síndrome de leche – alcalino) podrían ser necesarias otras medidas de rehidratación (ej. Infusiones). **INCOMPATIBILIDADES:** No procede. **NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE:** Rennie se presenta en blíster de aluminio/PVC, conteniendo 36 ó 48 comprimidos masticables. Puede que no todos los tamaños de envase estén comercializados. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** BAYER HISPANIA. S.L., Av. Baix Llobregat, 3-5 – 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). **P.V.P. con IVA:** Rennie comprimidos masticables con

sacarina: envase con 48 compr.: 7,65 €. Rennie comprimidos masticables con sacarosa: envase con 48 compr.: 7,65 €; envase con 84 compr.: 11,35 €. **MEDICAMENTO NO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA. FECHA REVISIÓN TEXTO:** Rennie comprimidos masticables con sacarina: Febrero 2020. Rennie comprimidos masticables con sacarosa: Febrero 2020.